

Clipping CIEVS Goiânia nº 10 no período de 05/11/2021 a 19/11/2021

No sentido de aprimorar a capacidade de alerta e resposta a emergências em Saúde Pública, o CIEVS-Goiânia realiza busca ativa de rumores veiculados pela mídia, por meio de um processo denominado "Clipping".

O clipping é realizado pelo CIEVS sem a verificação das áreas técnicas.

Notícias internacionais

Casos de covid-19 batem recorde na Europa próximo à chegada do inverno

OMS diz que nova fase é "preocupação grave"

As infecções pelo novo coronavírus estão atingindo níveis recordes em muitos países da Europa, enquanto o inverno se aproxima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu atenção aos governos e descreveu a nova onda como "preocupação grave".

Números de casos em disparada, especialmente no Leste Europeu, fazem com que se retome as discussões sobre a adoção de restrições da circulação, antes do feriado de Natal, e como convencer mais pessoas a se vacinarem.

O debate chega quando alguns países da Ásia, com exceção da China, reativam seus setores turísticos.

"O ritmo atual da transmissão nos 53 países da Europa é uma preocupação grave", disse o chefe regional da OMS, Hans Kluge, acrescentando que a disseminação foi ampliada pela variante Delta, que é mais transmissível.

Disponível na íntegra em: [Casos de Covid batem recordes na Europa próximo à chegada do inverno | Agência Brasil \(ebc.com.br\)](https://www.ebc.com.br/casos-de-covid-batem-recordes-na-europa-proximo-a-chegada-do-inverno)

Surto de Covid na China tem maior alcance desde a descoberta doença



Com o avanço da variante Delta, 20 províncias foram atingidas; cerca de 800 novos casos foram confirmados nas últimas três semanas

A Comissão de Saúde da China relatou 68 casos de Covid confirmados nesta sexta (5) e mais 22 infecções extras assintomáticas. Cerca de 800 pessoas foram diagnosticadas com a doença nas últimas três semanas.

O surto atual, relacionado à variante Delta, atingiu 20 províncias da China continental, o maior alcance desde a descoberta do vírus, no início de 2019, em Wuhan. A província de Heilongjiang, no nordeste, que concentra mais um terço do total de casos, se tornou o epicentro da doença.

Disponível na íntegra em: [Surto de Covid na China tem maior alcance desde a descoberta doença \(oantagonista.com\)](https://oantagonista.com/surto-de-covid-na-china-tem-maior-alcance-desde-a-descoberta-doenca)

Epidemia de vírus respiratório está a atingir recém-nascidos em Itália



Depois dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, que foram os primeiros a dar o alarme, uma forte epidemia de vírus sincicial respiratório (VSR) está a atingir a Itália, afetando crianças muito pequenas em todo o país. Os cuidados intensivos pediátricos dos hospitais estão cheios de crianças e bebês com bronquiolite e pneumonia causadas pelo vírus.

De acordo com os últimos números, em Pádua, existem 16 pequenos pacientes, dos quais 4 estão intubados em terapia intensiva e a situação é semelhante noutras regiões.

Disponível na íntegra em: [Epidemia de vírus respiratório está a atingir recém-nascidos em Itália – Jornal Txopela](#)

França reforça medidas contra a gripe aviária à medida que o vírus se espalha na Europa

O governo francês colocou todo o país em alerta máximo para a gripe aviária, enquanto o vírus se espalha pela Europa, disse o Ministério da Agricultura na sexta-feira.

A mudança estenderá a exigência de manter os rebanhos de aves dentro de casa, medida já implementada em algumas áreas desde setembro.

“Desde o início de agosto, 130 casos ou aglomerados de gripe aviária foram detectados em animais selvagens ou em fazendas na Europa”, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que três casos foram identificados em pássaros de quintal no nordeste da França.

Disponível na íntegra em: [França reforça medidas contra a gripe aviária à medida que o vírus se... - Notícias Agrícolas \(noticiasagricolas.com.br\)](#)

Primeiro surto de gripe de 2021 confirmado em Rhode Island



Um grupo de 28 alunos testou positivo para influenza A desde 24 de outubro na Universidade de Rhode Island (South Kingstown) conhecido pela primeira vez gripe O surto no estado é neste ano, segundo a secretaria estadual de saúde.

O laboratório estadual observou que os procedimentos de controle de infecção foram revisados com Universidade, mas não há tendências comuns conhecidas ligando esses alunos aos mesmos dormitórios ou salas de aula.

Disponível na íntegra em: [Primeiro surto de gripe de 2021 confirmado em Rhode Island \(90goals.com.br\)](#)

Covid-19: Pfizer Anuncia Comprimido Antiviral Com 89% De Eficácia

Farmacêutica norte-americana junta-se à Merck na corrida aos medicamentos contra o SARS-CoV-2 nos Estados Unidos

A Pfizer anunciou, nesta sexta-feira, que o seu medicamento antiviral para a covid-19, ainda em fase de experimentação, tem uma eficácia de 89% na prevenção de hospitalizações e mortes.

A farmacêutica norte-americana junta-se assim à Merck na corrida aos medicamentos contra a covid-19 nos Estados Unidos, tendo já submetido o pedido à autoridade do medicamento no país, a FDA, Food and Drug Administration. O Reino Unido, aliás, anunciou na quinta-feira uma autorização de uso condicional do antiviral da Merck, farmacêutica que na Europa se chama MSD.



O antiviral da Pfizer, cujo nome não é conhecido, estava em fase de testes, mas os resultados promissores em tão pouco tempo levaram a farmacêutica a avançar desde já com o pedido de autorização.

Disponível na íntegra em: [Covid-19: Pfizer anuncia comprimido antiviral com 89% de eficácia | TVI24 \(iol.pt\)](#)

Surto de doença exótica foi causado por spray de aromaterapia, diz CDC

Americanos foram contaminados com bactéria tropical, mas não saíram do país. Após meses de investigação, cientistas encontraram fonte

Pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos conseguiram desvendar o mistério que envolvia vários americanos contaminados com uma bactéria rara e presente apenas em climas tropicais. Dois pacientes morreram em decorrência da infecção pela *Burkholderia pseudomallei*, que causa melioidose.



A bactéria é mais comum em países como Tailândia, Malásia, Singapura e norte da Austrália. Ela é encontrada na água ou solo contaminado. Nenhuma das pessoas diagnosticadas ou suas famílias estiveram na região, uma vez que os casos aconteceram durante a pandemia.

Disponível na íntegra em: [Surto de doença exótica foi causado por spray de aromaterapia, diz CDC \(metropoles.com\)](#)

Notícias nacionais

Coronavírus hoje: Mais de 14 milhões de brasileiros podem estar com a segunda dose da vacina atrasada

O número faz parte do Boletim VigiVac, da Fiocruz Bahia, que fez as análises com base nos dados individuais anônimos fornecidos pela Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde

A segunda edição do Boletim VigiVac da Fiocruz Bahia, divulgado ontem (4), indica que, até 25 de outubro, 14.097.777 indivíduos estavam com mais de 15 dias de atraso para a segunda dose da vacina contra covid-19 no Brasil.

O número é o dobro do observado em 15 de setembro, quando foram registrados cerca de 7 milhões. As análises foram realizadas com dados individuais anônimos fornecidos pela Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19, do Ministério da Saúde.

Disponível na íntegra em: [Coronavírus hoje: Mais de 14 milhões de brasileiros podem estar com a segunda dose da vacina atrasada | Brasil e Política | Valor Investe \(globo.com\)](#)

Covid-19: com aumento de casos na Europa, Fiocruz faz alerta para o Brasil

Pesquisadores ressaltam que o continente europeu apresenta altas taxas de transmissão e circulação da doença e que o Brasil não deve relaxar precocemente as medidas de proteção

Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar que a Europa “enfrenta ameaça real de ressurgimento da Covid-19”, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que monitora a situação da pandemia no Brasil, destacou que vivemos uma fase no país “de maior alívio, mas não de menor preocupação”.

Os pesquisadores do Observatório da Fiocruz ressaltam que a Europa apresenta altas taxas de transmissão e circulação da Covid-19, e vive o espalhamento de novas variantes. A instituição afirma que o Brasil precisa “aprender com as lições que a Europa tem dado para não errar nos mesmos pontos”.

Disponível na íntegra em: [Covid-19: com aumento de casos na Europa, Fiocruz faz alerta para o Brasil | CNN Brasil](#)

Casos de dengue têm aumento de quase 50% em relação a 2020 no Piauí

105 municípios do Piauí já registraram casos este ano. Sesapi chama atenção para população redobrar cuidados no período chuvoso.

O Piauí já registrou 2.654 casos de dengue em 2021. O número é 44% maior que os casos registrados no mesmo período do ano passado, que contabilizou 1.773. Em pelo menos 105 dos 224 municípios piauienses já tiveram casos e a Secretaria Estadual da Saúde (Sesapi) alertou para que a população não



relaxe nos cuidados.

Os municípios com maior incidência de casos são: Altos, Bom Jesus, Cristino Castro, Dom Expedito Lopes, Floriano, Geminiano, Ilha Grande, Ipiranga do Piauí, Luís Correia, Novo Oriente, Oeiras, Parnaíba, Pedro II, Picos, Piri-piri, Santa Luz, Sussuapara e Teresina.

Disponível na íntegra em: [Casos de dengue têm aumento de quase 50% em relação a 2020 no Piauí | Piauí | G1 \(globo.com\)](#)

Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (3), o Boletim das Arboviroses nº 10. O relatório apresenta que, até a 42ª Semana Epidemiológica (SE), de 03 de novembro, foram registrados na Paraíba 8.797 casos prováveis de chikungunya, 1.349 de zika e 13.194 de dengue. O documento chama atenção também aos cuidados das mulheres gestantes com relação ao vírus da zika.



De acordo com a técnica da SES responsável pelas Arboviroses, Carla Jaciara, é importante ressaltar que, quando comparado ao mesmo período de 2020, o boletim apresenta um acréscimo de 116% de variação para os casos prováveis de dengue, um aumento bem maior, de quase 400%, para os casos prováveis de chikungunya, e 320% a mais de variação para zika.

Disponível na íntegra em [Saúde alerta para aumento de 400% para casos prováveis de chikungunya na Paraíba - PB AGORA](#)

Após Contato Com Raposa, Menino De 2 Anos Morre Em Decorrência Do Vírus Da Raiva

O caso aconteceu em Chapadinha, interior do Maranhão

Na última quarta-feira, 3, um menino de dois anos de idade, Luís Samuel Almeida da Silva, faleceu em decorrência do vírus da raiva. O caso aconteceu em Santa Rita, no município de Chapadinha, interior do Maranhão.

Em agosto deste ano, Luís teve contato com uma raposa e contraiu o vírus nesse incidente, como revelado por análise de laboratório. O animal apareceu em sua casa e foi morto pelo cachorro da família.

Ainda não se sabe se ele teve contato direto com o bicho silvestre ou se aconteceu em decorrência da

saliva do cachorro ter sido contaminada. O cão não teria adoecido por já ter tomado vacina casos da doença.

Disponível na íntegra em: [Aventuras na História · Após contato com raposa, menino de 2 anos morre em decorrência do vírus da raiva \(uol.com.br\)](#)

Amazonas está há 20 dias sem novos casos suspeitos de rabdomiólise, aponta FVS

Os últimos cinco casos suspeitos foram do município de Itacoatiara, notificados em 16 de outubro. Resultados preliminares de análise não constatou toxinas em peixes.

O Amazonas não registra casos suspeitos de rabdomiólise há 20 dias. A informação consta no 5º boletim sobre o cenário da doença no estado, divulgado nesta quinta-feira (4), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Nesta edição, são 66 casos suspeitos da doença em 10 municípios. Os últimos cinco casos suspeitos foram do município de Itacoatiara notificados em 16 de outubro.

No documento, consta um número de 120 casos notificados, até quarta-feira (3). Destes, 66 foram considerados suspeitos e os outros 54 foram descartados pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da FVS-RCP (CIEVS/FVS-RCP).

Permanecem 10 municípios que registraram casos suspeitos da doença, liderado por: Itacoatiara (35), Parintins (12), Manaus (6), Urucurituba (4), Silves (3), Maués (2), Autazes (1), Caapiranga (1), Itapiranga (1) e Manacapuru (1).

Disponível na íntegra em: [Amazonas está há 20 dias sem novos casos suspeitos de rabdomiólise, aponta FVS | Amazonas | G1 \(globo.com\)](#)

Notícias Municipais

Goiânia vai liberar 100% do público nos estádios na próxima semana

A prefeitura de Goiânia vai autorizar ocupação total dos estádios de futebol a partir da próxima semana. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira (4) pelo Paço Municipal. Atualmente, o decreto municipal permite 40% de público nos estádios de futebol. A lotação total valerá a partir da próxima terça-feira (9), quando será publicado o decreto com a flexibilização. A prefeitura de Goiânia informou também que crianças com até 12 anos também poderão entrar no estádio. A necessidade de apresentação de um teste negativo para a covid-19 também cairá. Porém, seguirá a obrigatoriedade de apresentar um cartão de vacinação.



Disponível na íntegra em: [Goiânia vai liberar 100% do público nos estádios na próxima semana \(diariodegoias.com.br\)](#)

Informe CIEVS-Goiânia para Síndrome Mão-Pé-Boca



Síndrome Mão-Pé-Boca

A SMPB é uma infecção viral causada pelo vírus Coxsackie da família dos enterovírus. É altamente contagiosa, e na ausência de medidas de controle adequadas, é comum a ocorrência de surtos (três ou mais casos em instituições fechadas). Quando houver a ocorrência de surtos em berçários, creches, CMEI, escolas, dentre outros, os mesmos deverão ser comunicados ao CIEVS-GOIÂNIA, através dos contatos abaixo.

Transmissão

Via fecal-oral, através do contato direto entre as pessoas, contato com as fezes, saliva e outras secreções, ou então através de alimentos e/ou objetos contaminados.

Tratamento

Ainda não existe vacina e a doença ocorre como outras infecções por vírus, regredindo espontaneamente depois de alguns dias. Na maioria dos casos, tratam-se somente os sintomas com antitérmicos e anti-inflamatórios.

Se liguem aos sinais!

Os sinais e sintomas incluem: febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões, em média (38-39,5°C), manchas vermelhas com vesículas branco acinzentadas na boca, amígdalas e faringe que podem evoluir para ulcerações muito dolorosas. Erupções de pequenas bolhas em palmas das mãos, face, punhos, espaços interdigitais e nas plantas dos pés, mas que também podem ocorrer nas nádegas e na região genital. Esporadicamente podem surgir complicações neurológicas, como a meningoencefalite.

Recomendações

- Bebidas geladas são indispensáveis para manter a boa hidratação do organismo, uma vez que podem ser ingeridos em pequenos goles;
- Crianças devem ficar em casa, em repouso, enquanto durar a infecção;
- Lembre-se sempre de lavar as mãos antes e depois de lidar com a criança doente, ou levá-la ao banheiro;
- Evitar abraçar e beijar, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;
- Manter um nível adequado de higienização da casa, das creches e das escolas;
- Não compartilhar mamadeiras, talheres ou copos, lavar superfícies, objetos e brinquedos que possam entrar em contato com secreções e fezes dos indivíduos doentes com água e sabão;
- Descartar adequadamente as fraldas e os lenços de limpeza em latas de lixo fechadas;
- Afastar os doentes da escola ou do trabalho até o desaparecimento dos sintomas (geralmente 5 a 7 dias após início dos sintomas).

ALERTA

Após a recuperação a criança, ainda pode transmitir o vírus pelas fezes durante aproximadamente quatro semanas.

Para maiores esclarecimentos e notificação de surtos seguem os contatos: Fone:(62) 3524-3389 – Dias úteis das 7 às 18 horas Plantão CIEVS: 99689-7470 – Período noturno, finais de semana e feriados.
Email: cievsgoiânia@gmail.com

Fonte: NOTA INFORMATIVA Nº. 01/2018 – CIEVS/GDAT/DVE/SVS
Colaboração: EVZ/UFG

Alertas de Desastres Naturais

Inmet divulga alerta de chuvas intensas em Goiás para mais da metade do Estado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou nesta segunda-feira (1º) alerta de perigo para mais da metade de Goiás, com aviso de chuvas intensas. Para a parte mais ao Sul do Estado, a previsão é de tempestade, com perigo potencial.

Os municípios localizados na parte laranja do mapa devem receber chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, e ventos intensos, entre 60 e 100 km/h. As cidades localizadas na região em amarelo devem ter precipitações entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

Disponível na íntegra em: [Inmet divulga alerta de chuvas intensas em Goiás para mais da metade do Estado - JORNAL DO VALE](#)

Elaboração: Equipe Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Goiânia (CIEVS):
Secretaria Municipal de Saúde: Durval Ferreira Fonseca Pedroso
Superintendência de Vigilância em Saúde: Yves Mauro Fernandes Ternes
Diretoria de Vigilância Epidemiológica: Grécia Carolina Pessoni
Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis: Marília Belmira de Castro Regô
Coordenadora CIEVS: Daniella Ribeiro de Paula Tibúrcio
Apoio técnico Fiocruz / Ministério da Saúde: Menandes Alves de Souza Neto