



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou Avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
			Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
CONSULTÓRIO NA RUA	Consulta de profissional de nível superior, paciente COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Consulta de profissional de nível superior, paciente SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acolhimento e escuta, paciente COM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Acolhimento e escuta, paciente SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acompanhamento de usuário transportado em ambulância, respeitando a Portaria 077/2014, COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Acompanhamento de usuário transportado em ambulância, respeitando a Portaria 077/2014, SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Visita na rua	X	X	Utilizar a precaução padrão. Os EPIs deverão ser utilizados mediante a avaliação da situação, se haverá possibilidade de contato com algum material biológico, na prestação de assistência.									
	Teste de glicemia, paciente COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Teste de glicemia, paciente SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Coleta de escarro	X	Solicitar ao paciente que se distancie do profissional e que colete o seu escarro, acondicionando-o corretamente no frasco de coleta. O profissional deverá pegar o frasco com luva látex não estéril.										

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou Avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
			Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
CONSULTÓRIO NA RUA	Transporte/acompanhamento, paciente COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Transporte/acompanhamento, paciente SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acompanhamento em consulta especializada, paciente COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Acompanhamento em consulta especializada, paciente SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Curativos, pacientes COM sintomas respiratórios	X	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
	Curativos, pacientes SEM sintomas respiratórios	X	X	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição à material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.									
	Preparo de medicamentos	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administração de medicamentos endovenosos, paciente COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Administração de medicamentos endovenosos, paciente SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Administração de medicamentos via subcutânea, intradérmica e intramuscular, pacientes COM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SERVIÇO	Procedimento	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou Avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
			Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
CONSULTÓRIO NA RUA	Administração de medicamentos via subcutânea, intradérmica e intramuscular, pacientes SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vacina (pacientes com sintomas respiratórios devem ser vacinados após o término dos sintomas)	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Retirar pontos, paciente COM sintomas respiratórios.	X	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
	Retirar pontos, SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verificação de SSVV, pacientes COM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Verificação de SSVV, pacientes SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Teste da mamãe, pacientes COM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Teste da mamãe, pacientes SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Coleta de citopatológico paciente COM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Coleta citopatológico pacientes SEM sintomas respiratórios.	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Coleta Swab/pesquisa viral (PCR)	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

1. As máscaras cirúrgicas devem ser trocadas a cada 6 horas de uso ou sempre que houver presença de sujidade e/ou umidade; 2. A máscara N95/PFF2 ou equivalente, deverá ser utilizada cada cinco plantões (servidores plantonistas) ou 10 dias de uso (servidores diaristas), enquanto mantenha sua integridade estrutural e funcional e o filtro não se apresente danificado ou com sujidade visível. 3. O avental de tecido será utilizado para proteção da pele e da roupa do profissional. Após seu uso deverá ser descartado no Hamper para ser encaminhado a lavanderia; 4. Para a coleta de secreção respiratória na realização de exame PCR, a unidade de saúde deverá organizar um local o mais ventilado possível e restrito a equipe de coleta e aos pacientes sintomáticos respiratórios que a aguardam. 5. Todos os servidores que quiserem podem solicitar o uso do protetor facial, mesmo não sendo indicado a eles. 6. Orientamos que o coletador deverá estar com a paramentação necessária e que poderá coletar de vários pacientes SEM TROCAR A PARAMENTAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA CONTATO COM O PACIENTE OU COM AS ÁREAS TOCADAS POR ELE. Não poderá sair do local de coleta paramentado.

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	látex estéril	látex não estéril	PVC cano longo						
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	Atendimento a usuário na unidade de saúde		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atendimento domiciliar	COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verificação de SSVV	COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	x	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Curativos	COM sintomas respiratórios	X	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição à material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.								

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO				Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	látex estéril	látex não estéril	PVC cano longo						
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR	Aspiração traqueal e Cuidados com a traqueostomia		X	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-
	Atendimento Fonoaudiológico (com manipulação da cavidade oral)	COM sintomas respiratórios	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Vacina (pacientes com sintomas respiratórios devem ser vacinados após o término dos sintomas).		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. As **máscaras cirúrgicas** devem ser trocadas a cada 6 horas de uso ou sempre que houver presença de sujidade e/ou umidade; 2. A **máscara N95/PFF2 ou equivalente**, deverá ser utilizada cada cinco plantões (servidores plantonistas) ou 10 dias de uso (servidores diaristas), enquanto mantenha sua integridade estrutural e funcional e o filtro não se apresente danificado ou com sujidade visível. 3. O avental de tecido será utilizado para proteção da pele e da roupa do profissional. Após seu uso deverá ser descartado no Hamper para ser encaminhado a lavanderia; 4. -Para a coleta de secreção respiratória na realização de exame PCR, a unidade de saúde deverá organizar um local o mais ventilado possível e restrito a equipe de coleta e aos pacientes sintomáticos respiratórios que a aguardam. Orientamos que o coletador deverá estar com a paramentação necessária e que poderá coletar de vários pacientes SEM TROCAR A PARAMENTAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA CONTATO COM O PACIENTE OU COM AS ÁREAS TOCADAS POR ELE. Não poderá sair do local de coleta paramentado. 5. Todos os servidores que quiserem podem solicitar o uso do protetor facial, mesmo não sendo indicado a eles.

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	Áreas administrativas.		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recepção com proteção de acrílico ou marcação de 1 metro de distância		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recepção sem proteção de acrílico ou distância menor de 1 m do paciente		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acolhimento e triagem		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consulta profissional	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Visita domiciliar	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Preparo de medicamentos		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administração de medicamentos endovenosos	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Administração de medicamentos endovenosos	SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-
	Administração de medicamentos subcutâneos, intradérmicos e intramuscular	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	Teste da mamãe	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Coleta citopatológica	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Coleta de escarro		Solicitar ao paciente que se distancie do profissional, vá para um local bastante arejado e que colete o seu escarro, acondicionando-o corretamente no frasco de coleta. O profissional deverá pegar o frasco com luva látex não estéril.											
	Teste do pezinho	SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
		COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
	Vacina (pacientes com sintomas respiratórios devem ser vacinados após o término dos sintomas)	SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Retirar sutura	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Verificação de SSVV	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
	Aferição de glicemia	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Lavagem de ouvido	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Realização de testes rápidos	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Atendimento ao usuário da farmácia		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Atendimento odontológico		X	-	X	X	-	-	-	X	X	-	X	-
	Curativos	COM sintoma respiratório	X	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição a material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.								
	Coleta de Swab/Pesquisa viral (PCR) **		X	-	X	-	X		X	-	-	X	X	-

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
	CME	Área limpa	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	Sapato fechado
		Área suja	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X
	Limpeza da unidade	Concorrente e imediata	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
		Terminal	X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X
	Unidade de Processamento de roupas (Lavanderia)	Coleta de roupa suja, transporte da roupa suja; área suja e área limpa	x	x	-	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição a material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.								

1. As máscaras cirúrgicas devem ser trocadas a cada 6 horas de uso ou sempre que houver presença de sujidade e/ou umidade; 2. A máscara N95/PFF2 ou equivalente, deverá ser utilizada cada cinco plantões (servidores plantonistas) ou 10 dias de uso (servidores diaristas), enquanto mantenha sua integridade estrutural e funcional e o filtro não se apresente danificado ou com sujidade visível. 3. O avental de tecido será utilizado para proteção da pele e da roupa do profissional. Após seu uso deverá ser descartado no Hamper para ser encaminhado a lavanderia; 4. Para a coleta de secreção respiratória na realização de exame PCR, a unidade de saúde deverá organizar um local o mais ventilado possível e restrito a equipe de coleta e aos pacientes sintomáticos respiratórios que a aguardam. Orientamos que o coletador deverá estar com a paramentação necessária e que poderá coletar de vários pacientes SEM TROCAR A PARAMENTAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA CONTATO COM O PACIENTE OU COM AS ÁREAS TOCADAS POR ELE. Não poderá sair do local de coleta paramentado. 5. Todos os servidores que quiserem podem solicitar o uso do protetor facial, mesmo não sendo indicado a eles. 6. Não há recomendação de se esperar minutos ou horas antes de iniciar a limpeza da área que o paciente estava acomodado. A sala ou o ambiente de atendimento poderá ser ocupada por outro paciente imediatamente, após a limpeza concorrente, imediata ou terminal. Dúvidas sobre a limpeza da unidade consultar recomendação para limpeza e desinfecção de superfícies do serviço de saúde da SMS Goiânia.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
UNIDADES DE URGÊNCIA	Áreas administrativas.		X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recepção com proteção de acrílico ou marcação de 1 metro de distância		X	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Recepção sem proteção de acrílico ou distância menor de 1 m do paciente		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acolhimento e triagem		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consulta profissional	Com sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		Sem sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sondagem Vesical	SEM sintomas respiratórios	X	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
		COM sintomas respiratórios	X	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-
	Preparo de medicamentos		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Intubação		X	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-
	Sondagem nasogástrica ou orogástrica		X	-	X	-	X	-	-	X	-	X	X	-
	Aspiração Orotraqueal		X	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-
	Administração de medicamentos endovenosos e punção endovenosa	COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Administração de medicamentos subcutâneos, intradérmicos e intramusculares.	COM sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

**PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável descartável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
UNIDADES DE URGÊNCIA	Retirar sutura	Com sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		Sem sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Verificação de SSVV	Com sintomas respiratórios	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		Sem sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aferição de glicemia	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Lavagem de ouvido	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Realização de testes rápidos	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Atendimento ao usuário da farmácia		X	X	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Atendimento odontológico		X	-	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-
	Curativos	COM sintoma respiratório	X	X	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-
		SEM sintoma respiratório	X	X	-	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição a material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.								
	Coleta de Swab/Pesquisa viral(PCR) **		X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X	-



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022

SERVIÇO	Procedimento	Condição de saúde do usuário	Higienização das mãos	Máscaras		Luvas			Óculos tipo aviador OU Protetor facial	Protetor facial E Óculos tipo aviador	Capote de tecido ou avental descartável	Avental impermeável	Gorro descartável	Botas impermeáveis cano longo
UNIDADES DE URGÊNCIA				Máscara cirúrgica	Respirador tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3	Látex estéril	Látex não estéril	PVC cano longo						
	Laboratório	procedimentos SEM geração de aerossóis	X	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
		Manipulação de amostras COM geração de aerossóis	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-
	RX	COM sintoma respiratório	X	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-
		SEM sintomas respiratórios	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Motorista (envolvido no transporte de trabalhador da SMS e/ou outras demandas da unidade de saúde).		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CME	Área limpa	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	Sapato fechado
		Área suja	X	-	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X
	Limpeza da unidade	Concorrente, imediata	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	X
		Terminal	X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X
	Unidade de Processamento de roupas (Lavanderia)	Coleta de roupa suja, transporte da roupa suja; área suja e área limpa	x	x	-	Os EPIS devem ser utilizados, mediante ao risco de exposição a material biológico (precaução padrão). O profissional deverá avaliar a necessidade do uso.								

PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022



1. As máscaras cirúrgicas devem ser trocadas a cada 6 horas de uso ou sempre que houver presença de sujidade e/ou umidade; 2. A máscara N95/PFF2 ou equivalente, deverá ser utilizada cada cinco plantões (servidores plantonistas) ou 10 dias de uso (servidores diaristas), enquanto mantenha sua integridade estrutural e funcional e o filtro não se apresente danificado ou com sujidade visível. 3. O avental de tecido será utilizado para proteção da pele e da roupa do profissional. Após seu uso deverá ser descartado no Hamper para ser encaminhado a lavanderia; 4. Para a coleta de secreção respiratória na realização de exame PCR, a unidade de saúde deverá organizar um local o mais ventilado possível e restrito a equipe de coleta e aos pacientes sintomáticos respiratórios que a aguardam. Orientamos que o coletador deverá estar com a paramentação necessária e que poderá coletar de vários pacientes SEM TROCAR A PARAMENTAÇÃO, DESDE QUE NÃO HAJA CONTATO COM O PACIENTE OU COM AS ÁREAS TOCADAS POR ELE. Não poderá sair do local de coleta paramentado. 5. Todos os servidores que quiserem podem solicitar o uso do protetor facial, mesmo não sendo indicado a eles 6. Não há recomendação de se esperar minutos ou horas antes de iniciar a limpeza da área que o paciente estava acomodado. A sala ou o ambiente de atendimento poderá ser ocupada por outro paciente imediatamente, após a limpeza concorrente, imediata ou terminal. Dúvidas sobre a limpeza da unidade consultar recomendação para limpeza e desinfecção de superfícies do serviço de saúde da SMS Goiânia.

Observação 1: Servidores de outras secretarias (Guardas Civis Metropolitanas entre outros) ou terceirizados, devem procurar órgão de origem para indicação e fornecimento dos EPis.

Observação 2: Conforme portaria da Anvisa NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 09 de março de 2022:

Devido ao aumento da demanda de atendimento causada pela emergência de saúde pública da COVID19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional e que sejam seguidas, minimamente, as recomendações abaixo:

- para minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (*face shield*), pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas expelidas pelo paciente.

- A máscara N95/PFF2 ou equivalente, deverá ser utilizada cada cinco plantões (servidores plantonistas) ou 10 dias de uso (servidores diaristas), enquanto mantenha sua integridade estrutural e funcional e o filtro não se apresente danificado ou com sujidade visível. O serviço de saúde deve definir um Protocolo para orientar os profissionais de saúde, minimamente, sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da integridade, tempo de uso e critérios para descarte das máscaras N95/PFF2 ou equivalente.

- O trabalhador de saúde deve inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas.

Observação 3: Compete ao gestor da unidade organizar local apropriado para o armazenamento das máscaras que serão reutilizadas pelos servidores.



PROTOCOLO DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O PERÍODO DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA E UNIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

6ª Edição: 29/04/2022

REFERÊNCIAS

1. Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Nota técnica Nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA**. Atualizada em 09/03/2022. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (2019- nCoV).
2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020 – 25/02/2021- Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2), 2021.
3. Goiás, Secretaria Estadual de Saúde. Comitê Estadual de Enfrentamento da SRAG. **Protocolo de Biossegurança para o Manejo de Pacientes com Suspeitas ou Confirmação de Influenza**. Quarta versão-04/04/2018.
4. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS). **Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID 19) na Atenção Primária à Saúde**. Versão Brasília-DF. 2020.
5. Goiânia, Superintendência de Vigilância em Saúde. Coordenação Municipal de Segurança do paciente e Controle de infecção em Serviços de Saúde – COMCISS. **Protocolo de Biossegurança para o Manejo de Pacientes com Suspeita ou Confirmação do Novo Coronavírus (SARS-CoV-2) - COVID 19**. Versão 2 – 09/04/2020.
6. Ministério da Saúde. **Prevenção ao COVID-19 no âmbito das Equipes de Consultórios na Rua**. Brasília, março de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Elaborado por:

Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental
Coordenação Municipal de Segurança do paciente e Controle de Infecção em Serviços de Saúde
Superintendência de Administração e Gestão de Pessoas
Diretoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Gerência de Saúde e Segurança do Trabalho dos Profissionais da SMS
Superintendência de Gestão de Redes
Diretoria de Atenção Primária e Promoção da Saúde
Diretoria de Atenção Secundária e Urgência e Emergência
Gerência de Urgências.