

### CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS RESIDENTES DO MUNICÍPIO

CONFIRMADOS

**391**

PROVÁVEIS

**40**

DESCARTADOS

**436**

SUSPEITOS

**125**

↓  
PERDA DE  
SEGUIMENTO

**75**

ÓBITOS

**00**

RECUPERADOS

**425**

### SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA



**79.814 casos**  
**54 óbitos**



**9.655 casos**  
**12 óbitos**



**543 casos**  
**0 óbitos**

### PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO



**384 casos**



**7 casos**

**Média de Idade: 32 anos**

**Idade Mínima: 17 anos**

**Idade Máxima: 64 anos**


Fonte: CIEVS Goiânia. Notificações registradas no sistema REDCap e CeVeSP, até às 15:00h, 15/11/2022. 2022 Monkeypox Outbreak Global Map às 15:00h 15/11/2022 Dados preliminares sujeitos a alterações, informe Monkeypox COE (dados estadual e nacional) 14/11/2022

### ASPECTOS CLÍNICOS



#### MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Uso de máscaras, higiene das mãos e descarte adequado de resíduos



#### TRANSMISSÃO

Flúidos corporais, gotículas, contato íntimo ou materiais contaminados



#### SINAIS E SINTOMAS

Febre, cefaleia, erupção cutânea, mialgia, adenomegalia, edema peniano, proctite e dor nas costas

### INFORMAÇÕES PARA POPULAÇÃO

**Caso Suspeito:** Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva\* de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas. \*lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central; e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Ao aparecer quaisquer sinais ou sintomas como febre alta e súbita, dor de cabeça, aparecimento de ínguas, inchaço de pênis, dores anorretais/sangramento e erupções cutâneas procure atendimento de um profissional de saúde para fazer avaliação clínica necessária.

**Perda de seguimento:** Casos que não tenha registro de vínculo epidemiológico, não realizou coleta de exame laboratorial OU realizou coleta de exame laboratorial, mas a amostra foi inviável OU teve resultado inconclusivo, não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial (30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas)