

### CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS RESIDENTES DO MUNICÍPIO

CONFIRMADOS

**397**

PROVÁVEIS

**42**

DESCARTADOS

**482**

SUSPEITOS

**91**

PERDA DE  
SEGUIMENTO

**69**

ÓBITOS

**00**

RECUPERADOS

**435**

### SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA



**83.212 casos**  
69 óbitos



**10.398 casos**  
14 óbitos



**555 casos**  
0 óbitos

### PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO



387 casos



10 casos

Média de Idade: 32 anos

Idade Mínima: 17 anos

Idade Máxima: 64 anos


Fonte: CIEVS Goiânia. Notificações registradas no sistema REDCap, E-SUS SINAN e CeVeSP, até às 15:00h, 22/12/2022. 2022 Global Trends, OMS, CDC às 15:00h 22/12/2022, informe Mpox COE - MS 21/11/2022. Dados preliminares sujeitos a alterações.

### ASPECTOS CLÍNICOS



#### MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Uso de máscaras, higiene das mãos e descarte adequado de resíduos



#### TRANSMISSÃO

Flúidos corporais, gotículas, contato íntimo ou materiais contaminados



#### SINAIS E SINTOMAS

Febre, cefaleia, erupção cutânea, mialgia, adenomegalia, edema peniano, proctite e dor nas costas

### INFORMAÇÕES PARA POPULAÇÃO

**Caso Suspeito:** Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva\* de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas. \*lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central; e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Ao aparecer quaisquer sinais ou sintomas como febre alta e súbita, dor de cabeça, aparecimento de ínguas, inchaço de pênis, dores anorretais/sangramento e erupções cutâneas procure atendimento de um profissional de saúde para fazer avaliação clínica necessária.

**Perda de seguimento:** Casos que não tenha registro de vínculo epidemiológico, não realizou coleta de exame laboratorial OU realizou coleta de exame laboratorial, mas a amostra foi inviável OU teve resultado inconclusivo, não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial (30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas)