



PREFEITURA DE GOIÂNIA



# INFORME EPIDEMIOLÓGICO MPOX GOIÂNIA-GO

Nº116- 1/6/2023

## CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS RESIDENTES DO MUNICÍPIO

CONFIRMADOS

**400**

PROVÁVEIS

**43**

DESCARTADOS

**553**

SUSPEITOS

**74**



PERDA DE SEGUIMENTO

**72**

ÓBITOS

**00**

RECUPERADOS

**443**

## SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA



**87.840 casos**  
143 óbitos



**10.948 casos**  
16 óbitos



**566 casos**  
0 óbitos

## PERFIL SÓCIODEMOGRÁFICO



390 casos



10 casos

Média de Idade: 32 anos

Idade Mínima: 17 anos

Idade Máxima: 64 anos


Fonte: CIEVS Goiânia. Notificações registradas no sistema REDCap, E-SUS SINAN e CeVeSP, até às 9:00h, 1/6/2023. informe Mpox - MS 26/5/2023. Card: Situação Epidemiológica no Brasil - MS 26/5/2023 Dados preliminares sujeitos a alterações.

## ASPECTOS CLÍNICOS



### MEDIDAS DE PREVENÇÃO

Uso de máscaras, higiene das mãos e descarte adequado de resíduos



### TRANSMISSÃO

Flúidos corporais, gotículas, contato íntimo ou materiais contaminados



### SINAIS E SINTOMAS

Febre, cefaleia, erupção cutânea, mialgia, adenomegalia, edema peniano, proctite e dor nas costas

## INFORMAÇÕES PARA POPULAÇÃO

**Caso Suspeito:** Indivíduo de qualquer idade que apresente início súbito de lesão em mucosas E/OU erupção cutânea aguda sugestiva\* de monkeypox, única ou múltipla, em qualquer parte do corpo (incluindo região genital/perianal, oral) E/OU proctite (por exemplo, dor anorretal, sangramento), E/OU edema peniano, podendo estar associada a outros sinais e sintomas. \*lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central; e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos – máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas. Ao aparecer quaisquer sinais ou sintomas como febre alta e súbita, dor de cabeça, aparecimento de ínguas, inchaço de pênis, dores anorretais/sangramento e erupções cutâneas procure atendimento de um profissional de saúde para fazer avaliação clínica necessária.

**Perda de seguimento:** Casos que não tenha registro de vínculo epidemiológico, não realizou coleta de exame laboratorial OU realizou coleta de exame laboratorial, mas a amostra foi inviável OU teve resultado inconclusivo, não tem oportunidade de nova coleta de amostra laboratorial (30 dias após o início da apresentação de sinais e sintomas).