FLUXO DE CASO SUSPEITO TUBERCULOSE

TOSSE PRODUTIVA HÁ 3 SEMANAS OU MAIS.

Solicitar Exame Escarro TRM-TB - 1 amostra.

ESCARRO NEGATIVO e alta suspeita clínica **>>>** Solicitar RX TX e CULTURA DE ESCARO >>> ***Se alterados:***

ESCARRO POSITIVO

NOTIFICAR+ iniciar ESQUEMA BÁSICO

Acompanhamento Clínico - monitorar mensalmente: FEBRE/TOSSE/EXPECTORAÇÃO/PESO/EF. ADVERSOS/ BACILOSCOPIA ESCARRO (INDISPENSÁVEL 2º,4º, 6º meses tto).

EF. ADVERSOS **MAIORES***

ENCAMINHAR AO PNEUMOLOGISTA

No **6º mês** tto, avaliar **CRITÉRIOS DE ALTA**:

-2 BAAR NEGATIVOS, *OU*

- MELHORA CLÍNICA E RADIOLÓGICA, *NA AUSÊNCIA DE ESCARRO .*

>>> OBS: Insistir na coleta de escarro (tentar mais de 1 vez) mesmo se paciente referir ausência de material.

BAAR positivo no 2º mês de tto e paciente evoluindo c/ melhora clínica >>> Não indica ausência de resposta ao tto – seguir acompanhamento na Unidade Básica de Saúde, e <u>solicitar CULTURA DE ESCARRO para Micobactérias c/ TESTE DE SENSIBILIDADE.</u>

Se presença de **Micobactéria atípica (na cultura escarro)** ou **Resistência (no teste de sensibilidade de escarro)**

OBS:
Se BAAR no 5º ou 6º mês de tto c/ poucos bacilos isolados E melhora clínica e radiológica >>>> NÃO SIGNIFICA FALÊNCIA DE TRATAMENTO! (Seguir com BAAR nos meses seguintes).