

PROCOLO ATENÇÃO PRIMÁRIA Nº 10		DATA: 05/09/2017	
 PREFEITURA DE GOIÂNIA	<b>ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA</b>	CÓDIGO SIGTAP: <b>03.01.06.003-7</b>	CBO: Médico, Cirurgião dentista
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO		
<b>DOR DE GARGANTA</b>	Atendimento prestado a pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizações de patologias crônicas, de baixa complexidade, que são acolhidos nas unidades básicas de saúde, sem agendamento prévio, onde recebem atendimento e tem sua necessidade assistencial atendida.	<b>FARINGITES VIRAIS</b> Diagnóstico: Clínico - Dor de garganta - Febre - Mal-estar - Rouquidão - Tosse - Conjuntivite - Diarréia pode estar presente Exame físico: - Oroscofia: hiperemia da faringe e das amígdalas, com ou sem vesículas ou ulcerações, e com ou sem exsudato amigdaliano Tratamento: - Sintomáticos  <b>FARINGITE ESTREPTOCÓCICA</b> Diagnóstico: Clínico - Dor de garganta de início súbito - Dor à deglutição - Febre - Cefaléia - Náuseas, vômitos e dor abdominal (principalmente em crianças) - Paciente entre 5 e 15 anos de idade - Apresentação no inverno ou no início da primavera (em regiões de climas temperados)	

- História de exposição

Exame físico:

- Oroscofia: eritema tonsilofaríngeo, exsudato tonsilofaríngeo, petéquias no palato mole, hiperemia e edema da úvula

- Rash cutâneo escarlatiforme

- Adenomegalias cervicais anteriores aumentadas de tamanho e dolorosas a palpação

Tratamento: Para prevenção de febre reumática

Agente	Dose	Via	Duração
Penicilina G benzatina	600.000U para pacientes < 27kg; 1.200.000U para > 27kg	IM	Dose única
Amoxicilina	50mg/kg/dia, dividida em duas ou três doses	VO	10 dias
Penicilina V (fenoximetilpenicilina)	Crianças: 250mg, duas a três vezes por dia, para < 27kg; para > 27kg, adolescentes e adultos: 500mg, duas a três vezes por dia	VO	10 dias
<b>PARA ALÉRGICOS À PENICILINA</b>			
Cefalosporinas de espectro estreito (cefalexina, cefadroxil)	Depende da droga	VO	10 dias
Eritromicina	50mg/kg (até 500mg), de 6h/6h	VO	10 dias
Azitromicina	12mg/kg, uma vez ao dia (máximo 500mg)	VO	5 dias
Claritromicina	15mg/kg por dia, dividida em duas doses (máxima 250mg, duas vezes/dia)	VO	10 dias
Clindamicina	20mg/kg por dia, dividida em 3 doses (máxima 1,8g/dia)	VO	10 dias

Fonte: (GERBER et al. 2009)

Encaminhar

- Abscessos: dor muito intensa, dificuldade para abrir a boca (trismo), desvio medial/abaulamento do palato mole e voz anormal (voz de batata quente)

- Febre reumática

Elaborado: Gerência de Atenção Primária a Saúde – SMS Goiânia

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Acolhimento à demanda espontânea : queixas mais comuns na Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012. 290 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume II)