


<b>POP Nº 31</b>		DATA: 05/09/2017	
 <b>PREFEITURA DE GOIÂNIA</b>	<b>COLETA DE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL</b>	<b>CÓDIGO SIGTAP: 02.01.02.004-1</b>	<b>CBO: Médicos, Enfermeiros Técnico ou Auxiliar de Enfermagem</b>
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO DA AÇÃO</b>	<b>MATERIAIS NECESSÁRIOS</b>	<b>DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO (POP)</b>
<b>COLETA DE ESCARRO</b>	Consiste em realizar uma coleta adequada do escarro, para identificar o mais rápido possível os casos bacilíferos de Tuberculose Pulmonar para tratamento precoce da patologia e interrupção da cadeia de transmissão.	-Pote plástico descartável e estéril; -Saco plástico; -Fita adesiva.	-Identificando o paciente sintomático respiratório; -Entregar ao mesmo o pote com identificação (nome completo, DN, Unidade de Saúde) fixa por fita adesiva; -Colher <b>SEMPRE NA UNIDADE</b> , durante o atendimento do sintomático; orientá-lo a ir para um local aberto e bem arejado em condições adequadas de biossegurança( quintal da unidade); -Respirar fundo umas 8 a 10 vezes e tossir profundamente e escarrar no frasco; -Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro; -Colher o escarro no recipiente de boca larga recomendado pelo laboratório; -Vedar a tampa do recipiente com uma fita adesiva e colocá-lo dentro do saco plástico e entregar na sala de triagem; -Caso o paciente seja identificado em atendimento domiciliar, orientar o cliente que pela manhã, imediatamente após acordar, eliminar o material de drenagem nasal que estiver presente; -Escovar os dentes e a lateral da boca e lavar com bastante água (não usar pasta de dente); -Ir para um local aberto e bem arejado em condições adequadas de biossegurança; -Respirar fundo umas 8 a 10 vezes e tossir profundamente e escarrar no frasco. 5. Preencher no mínimo 1,5 cm do frasco com escarro; -Colher o escarro no recipiente de boca larga recomendado pelo laboratório; -Vedar a tampa do recipiente com uma fita adesiva e colocá-lo dentro do saco plástico; -Receber a amostra do paciente, juntar ao material o pedido com todos os dados do paciente; -Lançar no livro de sintomático respiratório; -Higienizar as mãos;

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Registrar no prontuário/ SISTEMA do paciente;</li><li>-Acionar imediatamente o Distrito Sanitário para buscar a amostra;</li><li>-Teste rápido: Uma amostra, na ausência do teste rápido, colher amostras de escarro, pela manhã, em 2 dias consecutivos (ou conforme prescrição médica), e enviá-las a cada dia ao distrito, logo após a coleta, juntamente com a solicitação do exame.</li></ul>
Elaborado: Gerência de Atenção Primária a Saúde – SMS Goiânia			
Referências Bibliográficas: BRASIL. Manual de Normas Técnicas de Tuberculose para Unidades Básicas de Saúde. Ministério da Saúde, 2011.			