


POP SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Nº 8		DATA: 05/09/2017	
 PREFEITURA DE GOIÂNIA	EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	CÓDIGO SIGTAP: 0414020120	CBO: Cirurgião-dentista
AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	MATERIAIS NECESSÁRIOS	DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	Remoção cirúrgica de dentes decíduos erupcionados completamente na cavidade oral ou restos radiculares com sutura quando indicado.	<ul style="list-style-type: none"> • Kit Bandeja básica • Carpule • Agulha gengival • Anestésico tópico • Solução anestésica • Sugador • Compressa de gaze esterilizada • Jogo de alavancas apicais infantis • Fórceps infantil indicado • EPI (luva de procedimento, gorro máscara, óculos de proteção e avental) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lavar as mãos; 2. Calçar as luvas cirúrgicas (subentende-se que o CD já esteja paramentado); 3. Antissepsia intra-oral com clorexidina 0,12%; 4. Bloqueio anestésico (anestesia tópica prévia à punção é recomendada); 5. Sindesmotomia; 6. Luxação dentária evitando forças apicais (fórceps e extratores infantis); 7. Avulsão dentária (fórceps e extratores infantis); 8. Verificar necessidade de curetagem alveolar (cuidado com a integridade do germe do dente permanente sucessor); 9. Irrigação da ferida cirúrgica como soro fisiológico 0,9%; 10. A sutura se faz necessária sempre que ainda houver alvéolo (quando o dente extraído possuir mais de dois terços de raiz); 11. Hemostasia com gaze umedecida em soro fisiológico 0,9%; 12. Prescrição medicamentosa e orientações pós-cirúrgicas; 13. Retorno do paciente dentro de 7 a 10 dias para remoção da sutura (se necessário) e avaliação do pós-operatório, ou em caso de febre, edema progressivo, coleção purulenta, dor excessiva, alveolite.